

人血白蛋白说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

警告语:本品为血液制品,尽管经过筛选及灭活病毒处理,仍不能完全排除含有病毒等未知病原体感染和传播疾病传播的风险。

【药品名称】

通用名称:人血白蛋白

英文名称:Human Albumin

汉语拼音:Renxue Baidanbai

【成份】

人血白蛋白,本品系用健康人血浆,经物理分离法分离纯化,并经 60°C 、10小时加热处理等步骤后制成,不含防腐剂及稳定剂,不含防腐剂和抗生素。

【性状】

本品为略黏稠、乳白色或淡黄色澄明液体,不应出现凝块。

【适应症】

- 1.失血创伤、烧伤引起的休克。
- 2.脑水肿及损伤引起的颅压升高。
- 3.肝硬化及肾病引起的水肿或腹水。
- 4.低蛋白血症的防治。
- 5.新生儿高胆红素血症。
- 6.用于心肺分流术、烧伤的创面治疗、血液透析的辅助治疗和成人呼吸窘迫综合征。

【规格】

10g/瓶(20%, 50ml)

【用法用量】

用法:一般采用静脉滴注或静脉推注。为防止大量注射时机体组织脱水,可采用5%葡萄糖注射液或氯化钠注射液适当稀释作静脉滴注(宜用备有滤网装置的输血器)。滴注速度应控制在每分钟不超过20滴,但在病情严重或休克时,可酌情适当加快滴注速度,逐渐加速至上述速度。

用量:使用剂量由医师酌情考虑,一般因严重低蛋白血症所致水肿者,可静脉注射本品 20g 、 40g 、 60g 或 100g 。治疗肾病及肝硬化等慢性白蛋白缺乏症时,可每日注射本品 $5\sim 10\text{g}$,直至水肿消失,血清白蛋白含量恢复正常为止。

【不良反应】

上市后监测到人血白蛋白注射剂的下列不良反应/事件:

全身性疾病及给药部位局部反应:发热、寒战、过敏反应、皮疹、头痛、恶心、呕吐、注射部位疼痛、注射部位红肿、位感。

皮肤及皮下组织:皮疹、荨麻疹、斑丘疹、丘疹、红斑、水肿、瘙痒、荨麻疹、荨麻疹、血管性水肿。

呼吸系统:胸闷、呼吸困难、咳嗽、喉痛、支气管炎、口腔感觉异常、消化不良。

胃肠道系统:恶心、呕吐、腹泻、腹痛、腹胀、消化不良、口腔感觉异常、消化不良。

免疫系统:过敏反应、类过敏反应、严重过敏反应、过敏性休克。

心脏器官:心悸、心动过速、心律失常、房颤、心动过缓、心力衰竭、心肌梗死。

神经系统:头晕、头痛、震颤、感觉减退、味觉障碍、嗜睡、昏迷、癫痫、昏迷。

血管与淋巴管:潮红、发绀、苍白、四肢冰冷、低血压、高血压、肺水肿。

精神类:烦躁不安、抽搐、精神障碍、意识模糊、定向障碍。

肝胆系统:肝功能异常。

肾脏及泌尿系统:血尿、少尿、尿失禁、肾功能损害。

