




【不良反应】(1)皮肤及其附件损害：史蒂文斯-约翰逊综合征等。(2)神经系统损害：癫痫发作、无菌性脑膜炎等。(3)呼吸系统损害：急性肺中毒、急性呼吸窘迫综合征、急性肺水肿等。(4)造血系统损害：血小板减少、贫血、粒细胞减少等。(5)血液系统损害：血象异常、白细胞减少等。(6)其他：如过敏反应、肝功能异常等。

【禁忌】(1)对本品或本品成分过敏者禁用。(2)有严重肝肾功能损害者禁用。(3)有严重心血管疾病者禁用。(4)有严重免疫系统疾病者禁用。(5)有严重血液系统疾病者禁用。(6)有严重过敏反应者禁用。(7)有严重感染性疾病者禁用。(8)有严重营养不良者禁用。(9)有严重脱水者禁用。(10)有严重电解质紊乱者禁用。

【用法用量】口服：每次1片，每日3次，饭后服用。静脉注射：每次100mg，每日2次，用生理盐水稀释后缓慢注射。

【规格】0.1g/片。

【贮藏】遮光，密封，阴凉处保存。

【包装】铝塑包装，每盒10片。

【有效期】36个月。

【批准文号】国药准字H20050001。

【生产企业】博晖生物制药(河北)有限公司。

【生产地址】石家庄市南环路火炬开发区青园路5号。

【联系电话】0311-63935518。